



TRATTAMENTO DI UN AFFOLLAMENTO > 6 MM

Paziente Sesso: **F** Età: **34**

Richiesta del paziente Risoluzione dell'affollamento dell'arcata inferiore che le causa un eccessivo accumulo di tartaro.

Diagnosi

- Il classe scheletrica (ANB 5°)
- Normodivergente
- Diametri trasversali corretti
- Prima classe dentale
- Incisivi inferiori proclinati IMPA 100°
- Incisivi superiori normoinclinati
- Affollamento anteriore inferior 6,38 mm
- Bolton index 81.1%

Obiettivo del trattamento Risolvere affollamento senza proclinare ulteriormente gli incisivi inferiori.

Piano di trattamento

- Conferire corrette forme d'arcata
- IPR inferiore per normalizzare il Bolton e creare ulteriore spazio

Dettagli del trattamento

- N° allineatori: **35 + 15**
- Cambio: **10 gg**
- Durata: **18 mesi**
- Attacchi: **1.5 1.3 2.2 2.4 2.5 4.5 4.4 4.3 4.1 3.1 3.3 3.4 3.5**
- IPR: **Si, soprattutto inferiore**
- Ausiliari: **No**

Risultati del trattamento Risoluzione dell'affollamento.

Foto PRIMA
del trattamento



Foto DOPO
del trattamento

