



TRATTAMENTO DI UN MORSO INVERSO ANTERIORE

Paziente	Sesso: F Età: 46
Richiesta del paziente	Risoluzione del morso inverso nel settore frontale che provoca un difetto estetico.
Diagnosi	<ul style="list-style-type: none">• Il classe scheletrica e dentale, ipodivergente, I classe dentale, morso crociato anteriore con biprotrusione dentale e labiale• Bolton index anteriore 81.1 % (validato stripping inferiore)• Spazio richiesto nell'arcata superiore per correggere la protrusione: 2.92 mm• Spazio richiesto nell'arcata inferiore per correggere la protrusione: 3.48 mm
Piano di trattamento	<ul style="list-style-type: none">• Correggere la biprotrusione
Dettagli del trattamento	<ul style="list-style-type: none">• N° allineatori: 20 allineatori sup e 50 allineatori inf• Cambio: 10 gg• Durata: 24 mesi• Attacchi: 47 44 43 42 41 33 34 37 17 14 12 22 24 27• IPR: Si, soprattutto nel gruppo frontale inferiore• Ausiliari: No
Risultati del trattamento	Risoluzione del morso inverso e dell'affollamento.

Foto PRIMA
del trattamento



Foto DOPO
del trattamento

